

# Avertissements agricoles

D L P 30-10-87528266

®

Publication périodique

EDITION "GRANDES CULTURES"

ISSN 0757 4029

BULLETIN TECHNIQUE N° 30

29 OCTOBRE 1987

COLZA	: Vol faible mais net des charançons du bourgeon terminal Traitement avant le 5 Novembre dans les zones concernées
CEREALES	: Pas de vol de pucerons. Très faible niveau de population en cultures.

## - COLZA -

### CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL :

● Un premier pic de captures a été détecté les 19, 20 et 21 Octobre dans le Cher (Bourges, Rians), l'Indre (Valençay, Lizeray), l'Indre et Loire (Esvres, Monnaie) et le Loiret (Chatillon Coligny).

● Une seconde vague de capture vient de nous être signalée les 27 et 28 Octobre à Bourges (18).

● Le nombre de captures cumulées par piège est faible, peut être en raison des nombreux retournements de colzas en 1986 n'ayant pas permis la multiplication normale de ce ravageur. Cependant, par le passé, il a été impossible d'établir une relation (niveau des captures - dégâts) donc un risque de dégâts existe même en cas de faibles captures.

➔ Dans toutes les zones concernées (Berry et zones limitrophes -18,36- , Berry-Puisaye -45- ; sud de l'Indre et Loire ; sud Beauce de Loir et Cher), traitement dans les 15 jours suivant les premières captures, soit avant le 5 NOVEMBRE.

Produits: voir fiche couleur jointe au bulletin n° 22 du 13 Août

Remarque : si la parcelle héberge une cuvette jaune où il n'a pas été piégé de charançons, le traitement peut être évité (faible niveau général des populations cette année).

### DEGATS MECANQUES :

● Sur sols légers ou "creux" les fortes pluies de début Octobre, en rappuyant le sol, ont pu déchausser les colzas :

Dans ces situations, la violente tempête des 14, 15 et 16 Octobre a occasionné des sectionnements de plantes au niveau du sol (seul, le cylindre central est respecté)

● Les plantes suffisamment développées avant cet accident (4-5 feuilles) essaient maintenant d'émettre de nouvelles racines au-dessus de la zone d'étranglement des pivots.

➔ Si le dégât n'est pas trop important, un apport rapide d'ammonitrate peut aider le colza à se réenraciner et donc limiter l'incidence de ce phénomène.

POUR LE CHER ET L'INDRE, CES INFORMATIONS SONT DIFFUSEES EGALEMENT  
DANS LE CADRE DU CLUB COLZA SOPRA

Abonnement annuel : 135 F

Cheque a l'ordre du Régisseur de Recettes

a envoyer a l'adresse ci-dessous

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, Rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX - Tel. (38) 86.36.24

EDITION DE LA STATION "CENTRE"

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

Imprimerie de la Station "Centre"

Le Directeur-Gérant A. SIMONIN

CPPAP N 530 AD



P61

- CEREALES A PAILLE -

PUCERONS VECTEURS DE JAUNISSE NANISANTE :

● Vol pratiquement nul des pucerons vecteurs.

● Absence quasi-totale de pucerons sur les cultures en place, y compris sur les semis précoces actuellement au stade 2 feuilles.

➔ Pas de traitement dans l'immédiat. Surveillez attentivement les semis précoces pendant les heures chaudes de la journée, en cas de retour d'une belle période.

Remarque : Ne pas confondre les cicadelles (petits insectes sauteurs ~~vert~~ blanchâtre, présentes en grand nombre sur les cultures cet automne, avec des pucerons.

Le Service Régional de Statistique Agricole

*vous propose un nouveau document :*

LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DANS LA REGION CENTRE

Edition Septembre 1987

120 pages - 55 francs - Cité Coligny - 45042 Orléans Cédex 1 - Tél. 38 53 90 76

© SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1987. Toute reproduction partielle ou totale est soumise à notre autorisation.